

## Ordax Super



## Legfontosabb irtható gyomnövények:

- Kakaslábű
- Vadköles
- Muharfélek
- Pirók ujjasmuhar
- Baracklevelű keserűfű
- Selyemmályva
- Parlagfű
- Libatopfélék
- Szerbtövisfélék
- Árvakelésű napraforgó

## Általános adatok

Hatóanyag	336 g/l topramezon, 33% pendimetalin, 37% metiloleát és metilpalmitát 1:1 arányú keveréke
Hatóanyagcsoport	Pirazolok, anilidek, olajszármazékok
Forgalmazási kategória	I.
Engedély száma	Gyűjtőcsomag: 411/5/2006
Formuláció	Folyékony
Kiszerezés	0,45 l Clio + 10 l Stomp Super + 3 x 1 l Dash HC (3 ha-ra elegendő mennyiség)
Eltarthatóság	3 év
Méregjelzés, veszélyjelek	Az egyes összetevők szerint
Toxicitás	Az egyes összetevők szerint Méhekre mérsékelten veszélyes Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes
Tűzveszélyesség	Tűz- és robbanásveszélyes
Munka-egészségügyi várakozási idő	0 nap
Egyéb információ	Szezononként csak egy alkalommal használható

## Engedélyezett kultúrák

Kultúra	Károsító / felhasználás	Dózis	É.v.i.	Kijuttatási időszak / fejlettség
Kukorica (szemes-, siló-, csemege- és vetőmag-kukorica)	Magról kelő egy- és kétszikű gyomok	0,15 l/ha Clio + 3,3 l/ha Stomp Super + 1,0 l/ha Dash HC	90 nap	Posztemergensen

## Ordax Super

## Felhasználási előírások

Hatás / hatásspektrum	Magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények.
Hatáskifejtés	A növények levélen és gyökéren keresztül is felveszik. Szisztémikus, csúcsi és gyökérirányba is szállítódik.
Kijuttatási idő	Posztemergensen a kukorica 2-7 leveles állapotában bármikor, amikor a gyomok 2-4 levelesek.
A permetlé vízmennyisége	200-300 l/ha.
Permetléporlasztás	Apró cseppek képzésére alkalmas fúvókákkal.
Ideális hőmérséklet	15–25 °C között.
Ideális időszak	Nem befolyásoló tényező.
Hatásnövelő körülmények	Kijuttatás után párás, meleg idő, a talajon keresztüli hatáshoz bemosócsapadék.
Kombinálhatóság	Nincs korlátozás.
A felhasználás gyakorisága	Évenként egy alkalommal.
Utóvetemény-korlátozás	A biztonságos vetésváltás érdekében egy tenyészidőszakon belül csak egyszer kezeljük karotinoid-bioszintézist gátló hatóanyagot tartalmazó gyomirtó szerrel! A Clióval és kombinációival kezelt kukorica után korlátozás nélkül vethetők kalászosok és kukorica. Mélyszántást követően vethető napraforgó. A kezelés után 18 hónap elteltével vethető szója, a többi kultúra a kezeléstől eltelt 14 hónap után vethető.  A Clio és kombinációi nem használhatók cirok, cirkos kukorica, köles, valamint szudánifű gyomirtására.  Clio-kezelést követően extrém száraz körülmények között az utóveteményként vetett szója levélszéle kifehéredhet.
Megjegyzés	Az optimális hatáskifejtéshez Dash HC hozzáadására van szükség. A permetlé keverési sorrendje: a Clio és a Stomp Super elkeverése után a Dash HC-t vékony sugárban, folyamatos keverés mellett kell a permetléhez adagolni. Hideg vízben az adalékanyag könnyen kicsapódhat. Használat közben a permetezőgép belső falán olajos lerakódás keletkezhet, amit mosó- vagy mosogatószerrel feloldva lehet eltávolítani.