

SY Onestar CLP



- A SY Onestar a Clearfield®Plus szegmens egyik legújabb tagja, melyet kiváló termés-hozam és magas olajtartalom mellett maximális stabilitással is bír.

Jellemzői:

- korai érésideje akár a deszikkálás nélküli betakarítást is lehetővé teszi,
- alacsony vagy közép magas növekedésű, amely megkönnyíti a földi gépes növényvédelmet,
- a hatékony védelmet segíti kiváló betegség ellenállósága a Sclerotinia, a Verticillium és a rozsda fertőzésekkel szemben, de a Magyarországon ismert peronoszpóra rasszokkal szemben is toleráns, és a napraforgószerű A-E rasszával szemben is ellenálló.

2020-ban a a NÉBIH kísérletekben saját csoportjában az első helyen végzett 4,1 t/ha termésével. A legmagasabb, 5 tonna feletti termésátlagokat Székkutason, Jászboldogházán és Kiszomborban ért el.

A Syngenta fejlesztői mezoparcellás kísérleteiben 4,21 t/ha termésével 100-200 kg-mal megelőzte a legjobb vizsgált versenytársakat. Ugyancsak **2020-ban az IKR Agrár Kft. kísérleteiben**, 8 helyszín átlagában **szintén az 1. helyet szerezte meg**. Az **1.sz. grafikon** mutatja, hogy nemcsak a CLP csoport, hanem


a teljes vizsgált fajtasortiment vezető hibridje lett. De nemcsak termőképessége, hanem a termőhelyekhez való alkalmazkodása, **stabilitása alapján is a csoport legjobbja volt a 2.sz. grafikon szerint**. Jól reagál az intenzív termesztéstechnológiára, de gyengébb adottságú helyeken sem okoz csalódást, így gyakorlatilag mindenütt biztonsággal termesztethető.

Tudvalévő, hogy a Clearfield®Plus napraforgó hibridek posztemergens kezeléséhez kizárólag a napraforgóban jelenleg is engedélyezett imazamox hatóanyagtartalmú készítmények használhatók. A megnövekedett imidazolinon-ellenállóságú Clearfield®Plus napraforgóhibridek gyomirtására hazánkban a Pulsar Plus (25 g/l imazamox hatóanyagot tartalmaz) vagy az ezzel megegyező összetételű Listego Plus alkalmazható, amelyek azonos hatóanyag-mennyiségben kijuttatva a Pulsar 40 SL, illetve a Listego alapformulációnál hatékonyabb gyomirtó szerek. A Pulsar Plus, illetve a Listego Plus új adjuváns rendszere révén mind az egyszikű, mind a kétszikű gyomnövények esetében jelentősen fokozza a gyomirtó hatást. A kezeléseket 1,2-2 l/ha dózisban posztemergensen, a kultúrnövény 2 leveles állapotától 8 leveles fejlettségéig kell elvégezni. A kezelés optimális ideje a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles, a magról kelő egyszikű gyomfajok 1-3 leveles állapotában van.

1.sz. grafikon

Napraforgó hibridek termés szerinti rangsora és olajtartalma

2020. IKR Agrár kísérletek (8 helyszín)



2.sz. grafikon

CLP típusú napraforgó hibridek termés-szórása

2020. IKR Agrár kísérletek (8 helyszín)

