

Tebucor



**GOMBAÖLŐ PERMETEZŐSZER
KALÁSZOSOK, ŐSZI KÁPOSZTAREPCE,
SZŐLŐ VÉDELME.**

Hatóanyag tartalom

250 g/l tebukonazol

Formuláció

EW (olajemulzió vizes fázisban)

Hatásmód és hatékonyság

A hatóanyag a triazolok csoportjába tartozik, hatását preventív, kuratív és eradikatív módon is kifejti. Gombaölő hatását az ergoszterol bioszintézisének gátlása révén érvényesíti, valamint regulátor tulajdonsága a gibberelin bioszintézisének megakadályozásán alapul. Szisztémikus hatóanyag, felszívódása a növényben csúcs irányban (akropetálisan) történik.



Felhasználás

Kalászosokban a védekezés általában több betegség ellen irányul, ezért a kezelést megelőző jelleggel célszerű elvégezni, azaz a szárbba indulás kezdetén, továbbá a kalászhányás végén, virágzás idején végzett egy-egy permetezéssel.

Repcében a készítményt tölevélrózsás állapottól virágzásig célszerű kijuttatni levél- és szárbetegségek ellen. Az őszi kijuttatás (4-6 leveles állapottól tölevélrózsás állapotig) a téli-kora tavaszi fagykárt csökkenti.

Szőlőben lisztharmat ellen, preventív jelleggel, a virágzástól kezdve ajánlott védekezni. A védekezést a fertőzés fennállásáig célszerű folytatni. Egy tenyészidőszakban csak 3 alkalommal használható, a további szükséges kezeléseket más hatásmechanizmusú készítményekkel kell megoldani. Szürkerothadás ellen járványveszélyes időszakban más, a betegség ellen hatásos gombaölő szerrel kombináltan célszerű kijuttatni.

A Tebucor a Globachem N.V., Belgium bejegyzett márkaneve.

Forgalmazási kategória: II.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig)

Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles

Eltarthatóság: eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédőszer-raktárban 2 év.

Kiszerezés: 5 literes műanyag kanna

*Felhasználás előtt minden esetben olvassa el és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat, valamint az engedélyokiratban szereplő előírásokat!
A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk!*

A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

Kultúra	Károsító	Kijuttatáshoz szükséges		ÉVI (nap)
		szer (l/ha)	víz (l/ha)	
		mennyiség		
kalászosok (őszi búza, őszi és tavaszi árpa, zab, rozs, tritikálé)	gabonalisztharmat, gabonarozsda, helmintospóriumos és szeptóriás betegségek, kalászfuzáriózis	1,0	250-400	35
őszi káposztarepce	plenodómuszos (fómás) és alternáriás betegségek, fehér- és szürkepenész fagykár csökkentése	0,5-1,0	250-400	56
szőlő (bor)	lisztharmat, szürkerothadás	0,4	400-800	14

A felhasználásra vonatkozó további előírások:

Kultúra	Kezelések maximális száma	Két kezelés közt eltelt minimális időtartam (nap)	Az utolsó kezelés időpontja
kalászosok	2	21	virágzás
őszi káposztarepce (fagykár csökkentés)	1	—	tőlevélrózsás állapot
őszi káposztarepce (betegségek)	2	21	virágzás vége
szőlő (bor)	3	14	zsendülés



Családommal Pest megyében gazdálkodunk kiskunlacházi központtal, területeinken 450 hektáron folyik növénytermesztés, amit közel 100 hektáron egészít ki kertészeti munka. A Tebucor-t a kalászos gabonáinkban alkalmazzuk megelőző jelleggel, ezek között búza, árpa, tritikálé terem a gazdaságban. A termék hatóanyagát, a tebukonazolt már előzőleg ismertük a gombabetegségek elleni védekezésből. Kiváló hatásfokkal dolgozik a vegyület, amit a Tebucor véleményem szerint a legjobb ár-érték arányon tesz elérhetővé a piacon. A kalászosokban kalász- és lombzatr védelemhez használtuk 1 liter/hektár dózisban. Sikeresen előzte meg a fuzáriumot, a leveleken nyoma sem volt fertőzésnek. Az őszi káposztarepcében őszi kezeléssel kiváló megoldást jelentett a reguláláshoz, míg a tavaszi kijuttatás kedvezően befolyásolta a termésmennyiséget. A folytatásban is használni fogjuk, más gazdálkodóknak is jó szívvel ajánlom a használatát.

Dr. Nagy László, termelő
Pest megye